



COVID-19: Distribuce vakcín



Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

od dnešního dne je nově možné objednat vakcínu **Comirnaty** (Pfizer, BioNTech) do ordinací **praktických lékařů** (poskytovatelů zdravotních služeb s odborností 001, resp. 002), **očkovacích center** (poskytovatelé zdravotních služeb s odborností 961, resp. 962) a do **center zdravotních služeb**.

Vakcíny můžete objednávat již nyní na webu vakciny.avenier.cz.

Distribuce vakcíny Comirnaty bude spuštěna v pondělí **25. 10.**



Aktuální informace k distribuci vakcíny Comirnaty naleznete v článku na webu vakciny.avenier.cz.

OBJEDNÁNÍ VAKCÍN

- Dle Rámcové dohody o distribuci vakcíny je možné objednat balení **po 30 dávkách**.
- **Primárně jsou objednávky přijímány přes web vakciny.avenier.cz.**
- Objednání vakcíny bude potvrzeno e-mailem.
- Při vytváření objednávky není stanoven limit pro množství objednaných vakcín.
- Objednávky vytvořené v týdnu od 18. 10. zavezeme v týdnu od 25. 10. ve Váš standardní závozový den.

- Od 25. 10. budou probíhat závozy vakcín tak, jak jste zvyklí, v nejbližší standardní závozový den. Objednávky vakcíny budeme přijímat vždy do 10:00 h před dnem Vašeho závozu.

PŘEHLED OČKOVACÍCH LÁTEK PROTI COVIDU-19

VAKCÍNA	COMIRNATY	COVID-19 VACCINE JANSSEN	SPIKEVAX (COVID-19 VACCINE MODERNA)	VAXZEVRIA (COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA)
Počet dávek	2	1	2	2
Interval mezi dávkami	21–23 dní* (dle SPC 3 týdny)	1 dávka ve zvolený den	25–35 dní* (dle SPC 28 dní)	84–91 dní* (dle SPC 4–12 týdnů: 28–84 dní)
Skladování v ordinaci	2 až 8 °C	2 až 8 °C	2 až 8 °C	2 až 8 °C
Doba skladování neotevřené vakcíny (při 2 až 8 °C)	1 měsíc po rozmrazení ²	4,5 měsíce po rozmrazení ²	30 dní po rozmrazení ²	6 měsíců od data výroby ²
Doba skladování vakcíny po natažení první dávky	6 hodin při 2 až 30 °C	6 hodin při 2 až 8 °C 3 hodiny při 8 až 25 °C	19 hodin při 2 až 25 °C	48 hodin při 2 až 8 °C 6 hodin při 8 až 30 °C

¹ Interval stanovený MZ ČR dne 14. 7. 2021, platné ke dni 15. 7. 2021.

² Datum expirace je v souladu s SPC vyznačeno na vnějším obalu.

SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY:

- neživá mRNA vakcína
- určena pro osoby od 12 let věku



BALENÍ OBSAHUJE:

- celkem je v jednom balení 30 dávek vakcíny (balení nelze dělit)
- jedno balení obsahuje 5 injekčních lahviček (0,45 ml) – každá injekční lahvička obsahuje 6 dávek po 0,3 ml **po naředění** (návod k přípravě vakcíny naleznete v SPC vakcíny)
- balení neobsahuje injekční stříkačky a jehly
- součástí dodávky nad rámec obsahu balení bude samolepka šarže

OČKOVACÍ

SCHÉMA:

- sestává ze 2 dávek (0,3 ml) podaných intramuskulárně v intervalu 21–23 dnů* (dle SPC 3

týdny)

*Interval stanovený MZ ČR dne 14. 7. 2021, platné ke dni 15. 7. 2021.

PŘEOČKOVÁNÍ:

- MZ ČR dočasně povoluje použití registrovaných léčivých přípravků **Comirnaty** (Pfizer, BioNTech) a **Spikevax** (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) jako posilovací nebo dodatečnou třetí dávku v rámci očkovacího schématu proti onemocnění covid-19.

POSILOVACÍ

(BOOSTER)

DÁVKA

Posilovací (booster) dávka se podává s platností od 18. 10. 2021 **nejdříve za 6 měsíců** od dokončení základního očkovacího schématu. Posilovací dávka není omezena na určitou skupinu osob.

Posilovací (booster) dávka je doporučena zejména pro:

- seniory ve věku 65+ let,
- osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
- osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19,
- zdravotníky a pracovníky v zařízení sociálních služeb, kteří v minulosti onemocnění covid-19 nikdy neprodělali.

DODATEČNÁ

DÁVKA

V případě nově zahájeného očkování se dodatečná dávka podává **nejdříve po uplynutí 4 týdnů** od dokončení základního očkovacího schématu (vakcíny Comirnaty, Spikevax nebo Vaxzevria). Ministerstvo nevyklučuje podání dodatečné dávky těm pacientům, kteří byli očkovaní jednodávkovou vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson). Podání dodatečné dávky vakcíny je určeno těm pacientům, u kterých bylo dokončeno základní očkovací schéma a u nichž byl diagnostikován alespoň jeden z následujících zdravotních stavů:

- středně těžká a těžká imunosuprese,
- středně těžký nebo těžký primární imunodeficit,
- pokročilá nebo neléčená infekce HIV nebo stav vyžadující imunosupresivní terapii, a to za podmínky, že tento způsob použití předmětných léčivých přípravků je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky.

Dodatečnou dávku lze podat pouze na základě doporučení lékaře pracoviště, které se zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů.

SKLADOVÁNÍ:

- před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě -90 °C až -60 °C
- závoz do ordinací bude probíhat v rozmrazeném stavu při teplotě 2 °C až 8 °C

- po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena
- v ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, expirace neotevřené injekční lahvičky je až **1 měsíc po rozmrazení**, datum je v souladu s SPC vyznačeno na vnějším obalu
- vakcína musí být chráněna před světlem
- stabilita vakcíny po otevření před použitím byla prokázána po dobu 6 hodin při teplotě 2 °C až 30 °C po naředění

Souhrn údajů o přípravku Comirnaty* ke stažení [zde](#).

V případě technických potíží při vytváření objednávky online se obraťte na naši zákaznickou linku nebo e-mail vakciny@avenier.cz.

Linka 800 11 22 33 je v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 h.

Aktuální informace k distribuci Comirnaty naleznete v článku na webu vakciny.avenier.cz [zde](#).

* Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

- [Stránky výrobce](#)
- [SÚKL informace o vakcíně](#)
- [Přehled pro vakcínu Comirnaty \(EMA\)](#)
- [SPC vakcíny](#)
- [Metodický pokyn pro očkovací kampaň \(MZ ČR\)](#)
- [Informace k očkování na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR](#)
- [Strategie očkování proti COVID-19 v České republice \(MZ ČR\)](#)
- [Mimořádné opatření MZ ČR o určení termínu podání druhé dávky očkovací látky proti COVID-19 \(MZ ČR\)](#)

- [Doporučení pro očkování těhotných a kojících žen proti COVID-19](#) (ČVS ČLS JEP)
- [Tisková zpráva MZ ČR o vakcinaci po prodělání nemoci COVID-19](#) (MZ ČR)
- [Informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19](#) (MZ ČR)
- [Doporučení k očkování dětí a adolescentů](#) (ČVS ČLS JEP)
- [Doporučení k přeočkování a aplikaci dodatečných \(třetích\) dávek vakcíny proti COVID-19](#) (ČVS ČLS JEP)
- [Aktualizované doporučení pro očkování proti onemocnění COVID-19](#) (ČVS ČLS JEP)
- [Rozhodnutí o aplikaci dodatečné 3. dávky proti COVID-19](#) (MZ ČR)
- [Rozhodnutí o aplikaci posilující 3. dávky proti COVID-19](#) (MZ ČR)